



Rif. J-00041300-2



Laboratorios Politécnicos Nacionales, C.A.

VADEMECUM



Línea de Antibióticos

Amoklavin-BID

Principio Activo: Amoxicilina con Ácido Clavulánico.

Grupo Terapéutico: Antibacterianos betalactámicos, penicilinas.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes productores de betalactamasa sensibles a la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico.

Dosificación:

Adultos: 875 mg de Amoxicilina - 125mg de Ácido Clavulánico cada 12 horas.

Neonatos 30 mg/kg/día, dividida cada 12 horas.

Lactantes y niños: 20 - 40 mg/kg/día, dividida cada 8 horas.



Presentaciones:

Estuche con Blister de 14 Tabletas Recubiertas con 825 mg de Amoxicilina + 125 mg Ácido Clavulánico.

Frasco de 70 ml con 400 mg Amoxicilina + 57 mg Ácido Clavulánico.

Línea de Antibióticos



Azitro

Principio Activo: Azitromicina.

Grupo Terapéutico: Macrólidos y Similares.

Indicaciones: Infecciones causadas por gérmenes sensibles a la azitromicina. Infecciones genitales no complicadas causadas por: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae. Tratamiento de la faringitis causada por Streptococcus Pyogenes del grupo A. Tratamiento de la otitis media aguda.

Dosificación:

Adultos y niños con peso superior a 45 kg: 500 mg 1 vez al día por 3 días.

Presentaciones:

Estuche con Blister de 3 Tabletas Recubiertas de 500 mg



Deklarit

Principio Activo: Claritromicina.

Grupo Terapéutico: Macrólidos y Similares.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la claritromicina. Tratamiento de la infección producida por Helicobacter pylori.

Dosificación:

Adultos y niños mayores de 12 años: 250-500 mg, cada 12 horas. Dosis Máxima 500 mg día.

Presentaciones:

Estuche con 2 Blister de 7 Tabletas Recubiertas cada uno de 500 mg.

Línea Antiviral



PRODUCTO OTC

Aciclovir

Principio Activo: Aciclovir.

Grupo Terapéutico: Antivirales.

Indicaciones: Tratamiento del herpes genital inicial y recurrente, herpes labial y de infecciones mucocutáneas localizadas producidas por el virus de herpes simple.



Dosificación:

Crema: Aplicar cada 4 horas la cantidad suficiente para cubrir la superficie afectada, cinco veces al día, durante 5 días, exceptuando las horas de sueño.

Si pasado este tiempo la curación no es completa, se continuará el tratamiento durante 5 días más hasta un total de 10 días.



Dosificación:

Tabletas: 400 mg cada 8 horas por 7 a 10 días, o dependiendo de la prescripción médica hasta una dosis máxima de 800 mg/día.

Presentaciones:

Estuche con Blister de 25 y 10 Tabletas de 200 mg
Tubo de 50 g contenido de 50 mg de Aciclovir

Línea Cardiometabólica



Cardiovascular



Losapres Plus

Principio Activo: Losartán + Hidroclorotiazida.

Grupo Terapéutico: Antagonistas de Angiotensina II, combinaciones.

Indicaciones: Tratamiento de hipertensión arterial en pacientes que no responden a la monoterapia

Dosificación:

Adultos: 50 - 100 mg de losartán asociados a 12.5 - 25 mg de hidroclorotiazida, una vez al día. Dosis máxima diaria 100 mg de losartán asociados a 25 mg de hidroclorotiazida.

Presentaciones:

Estuche con Blister de 28 Tabletas Recubiertas de 50 mg Losartan + 12,5 mg HCT

Enoval®

Principio Activo: Enalapril.

Grupo Terapéutico: Inhibidores ECA solos

Indicaciones: Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardíaca congestiva III y IV, Hipertensión renovascular unilateral y Prevención de dilatación y disfunción ventricular progresiva en pacientes post-infartados

Dosificación:

Según criterio médico, cuando el paciente requiera dosis de 10 mg/ día.

Dosis de mantenimiento: 20 mg/día dividida en 1 o 2 tomas diarias.

Presentaciones:

Estuche con Blister de 30 Tabletas de 10 mg



Línea Cardiometabólica



Cardiovascular



Vazkor

Principio Activo: Amlodipina.

Grupo Terapéutico: Bloqueantes selectivos de los canales de calcio con efectos principalmente vasculares.

Indicaciones: Tratamiento de Hipertensión arterial y ángor pectoris. Coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica severa. Tratamiento de la Angina vasoespástica (Prinzmetal).

Dosificación:

Adultos: 2,5 a 10 mg/día. Dosis máxima diaria Adultos: 10 mg/día.

Presentaciones:

Estuche con Blister de 20 Tabletas de 5 y 10 mg.

Hipolipemiante

Colastin-L

Principio Activo: Atorvastatina.

Grupo Terapéutico: Inhibidores de la HMG-CoA reductasa.

Indicaciones: Hipolipemiante en niños mayores de 10 años y adultos con hipercolesterolemia primaria, hiperlipidemia combinada (mixta) e hipercolesterolemia familiar heterocigota y homocigota, Prevención de eventos isquémicos recurrentes en pacientes con dislipidemias y enfermedad coronaria.

Dosificación:

Niños Mayores de 10 años: Cuando se requiera una dosis de 20 mg/día.

Dosis Máxima: 20 mg/día. Adultos: cuando se requiera dosis de 20 mg a 80 mg/día, ajustando dosis según respuesta clínica.

Presentaciones:

Estuche de 30 Tabletas Recubiertas de 20 y 40 mg



Línea Cardiometabólica

Hipoglicemiantes



Glunovag®

Principio Activo: Metformina.

Grupo Terapéutico: Hipoglicemiantes Orales Solos.

Indicaciones: : Control de la glicemia en pacientes diabéticos tipo II con o sin obesidad. Control de la glicemia en niños mayores de 10 años y adolescentes con diabetes tipo II con o sin obesidad, y que el control con dieta y ejercicio no sea suficientes para el control de la glicemia. En asociación con otros antidiabéticos orales o con insulina para el tratamiento de pacientes diabéticos tipo II cuyo control metabólico no se logra con la terapia convencional.

Dosificación:

Niños mayores de 10 años y adolescentes: 500 a 1000 mg dos o tres veces al día. Dosis máxima: 3000 mg/día

Adultos: Tabletas: 500 - 850 mg dos ó tres veces al día. Dosis máxima: 3000 mg / día.

Presentaciones:

Frasco de 60 Tabletas de 500 mg y Frasco de 30 Tabletas de 850 mg



Línea Dermocosmética

Especialistas en el Cuidado de la Piel.



Diadex pHIS[®]

Ingredientes Activos: Fenol, Lanolina y Laureth Sulfato de Sodio.

Grupo Terapéutico: Antisépticos y desinfectantes

Indicaciones: Sustituto del jabón, tratamiento del acné y como coadyuvante en la higiene íntima corporal.

Modo de empleo:

Vierta una pequeña cantidad del jabón líquido en la palma de la mano, frótese y enjuáguese con abundante agua.

Presentaciones:

Envase de Pet con Válvula dispensadora de 1000 mL y 500 mL.

Envase de Pet con tapa de rosca de 1000, 500 y 120 mL.



¡La rutina de higiene que tu cuerpo necesita!

Línea Dermocosmética

Especialistas en el Cuidado de la Piel.



Diadex® especialista en piel de bebés

Diadex® con Aloe Vera Previene

Ingredientes Activos: Óxido de Zinc, Aloe Vera, Extracto de Caléndula Lanolina y Vitamina E.

Clase Terapéutica: Emolientes y Protectores.

Indicaciones: Crema suavizante y protectora para evitar la pañalitis. USO DIARIO, Previene la pañalitis

Modo de empleo: Aplicar diariamente de manera abundante sobre la piel limpia y seca, después del baño y en cada cambio del pañal.

Presentaciones: Estuche con Tubo de 50 g.



Diadex® con Pantenol Repara

Ingredientes Activos: Pantenol.

Clase Terapéutica: Emolientes y Protectores.

Indicaciones: Crema emoliente y suavizante, recomendada específicamente para la piel irritada.

Modo de empleo: Aplique de manera abundante sobre la piel irritada hasta cubrir totalmente el área. Repita la operación por lo menos tres veces al día.

Presentaciones: Estuche con Tubo de 50 g.

¡Evita, alivia, refresca y elimina el ardor causado por las irritaciones!

Línea Gástrica



Danovag®

Principio Activo: Omeprazol.

Grupo Terapéutico: Inhibidor de la Bomba de protones.

Indicaciones: : Tratamiento de Úlceras Gástricas y duodenales, esofagitis por reflujo, Enfermedad de Zollinger Ellison y toda patología a hipersecreción gástrica. Tratamiento de lesiones gastroduodenales producidas por antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)

Dosificación:

Úlcera gástrica, úlcera duodenal y esofagitis por reflujo 20 mg 1 vez al día por 4 semanas

Dependiendo de lo indicado por el médico prescriptor varia de 20 a 40 mg 1 vez al día por 4 u 8 semanas.

Presentaciones:

Estuche con Blíster de 7 y 14 cápsulas de 20 mg



Degastrol®

Principio Activo: Lansoprazol.

Grupo Terapéutico: Inhibidor de la bomba de protones.

Indicaciones: Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica. Tratamiento de la esofagitis por reflujo. Profilaxis de la esofagitis por reflujo. Erradicación de Helicobacter pylori (H. pylori)

Dosificación:

Adultos y niños mayores de 12 años: que requieran dosis de 30 mg una vez al día.

Presentaciones:

Frasco de 14 y 28 Cápsulas de Micropellet de 30 mg

Línea Gástrica



Pandev

Principio Activo: Pantoprazol.

Grupo Terapéutico: Inhibidor de la bomba de protones.

Indicaciones: : Tratamiento de la úlcera duodenal, úlcera gástrica, reflujo gastroesofágico, esofagitis por reflujo y síndrome de Zollinger-Ellison.

Dosificación:

Úlcera gástrica 40 mg/día por 4 semanas. Úlcera duodenal 40 mg/día por 2 semanas. En casos particulares pueden ser 80 mg/día.

Presentaciones:

Estuche con Blíster de 28 Tabletas entéricas 40 mg.



**PRODUCTO
OTC**

Polantac®

Principio Activo: Trisilicato de Magnesio, Oxido de Magnesio y subcarbonato de Bismuto

Grupo Terapéutico: Antiácidos Solos.

Indicaciones: Antiácido coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad úlceras pépticas, gastritis y esofagitis.

Dosificación:

1 a 2 tabletas entre comidas y antes de dormir.

Presentaciones:

Estuche con Blíster de 10, 20 y 30 Tabletas.

Línea Ginecológica

Equin

Principio Activo: Estrógenos Conjugados

Grupo Terapéutico: Hormonas sexuales tópicas


Indicaciones: Tratamiento de vaginitis atrófica, dispareunia y Kraurosis vulvae

Dosificación:

De 1 a 2 g diarios, por vía intravaginal o tópica, dependiendo de la gravedad de la condición. A criterio médico, la dosis puede aumentarse hasta 4 g diarios. La administración debe ser cíclica (ej. tres semanas de terapia y una semana sin terapia).

Presentaciones:

Tubo de 42,5 g de 0,625 mg/g con 1 aplicador.



Línea Madecassol



Madecassol® Tabletas

Principio Activo: Extracto de Centella Asiática 10 mg

Grupo Terapéutico: Antivaricoso sistémicos

Indicaciones: Tratamiento de la insuficiencia venosa y de los estados pre-varicosos de los miembros inferiores. Cicatrizante de heridas, quemaduras, queloides.

Dosificación:

Tomar 3 a 6 Tabletas antes o después de las comidas.

Presentaciones:

Estuche de 30 Tabletas de 10 mg.



Madecassol® Polvo y Ungüento

Principio Activo: Extracto Titulado de Centella Asiática (ácido asiático 30%, ácido madecásico 30% y asiaticósido 40%)

Grupo Terapéutico: Cicatrizantes.

Indicaciones: Cicatrizante de heridas (Traumáticas y quirúrgicas) injertos cutáneos, úlceras de piernas, escaras de decúbito. Tratamiento de quemaduras, queloides, cicatrices retracts.



Dosificación:

Vía Tópica: Aplicación local (polvo o ungüento)
1 o 2 veces al día previa limpieza y desinfección de heridas.

Presentaciones:

Estuche con tubo de 10 g y 20 g al 1%
Estuche con Tarro de Polvo de 5 y 10 g al 2%

Línea Neurológica



Carpin®

Principio Activo: Carbamazepina.

Grupo Terapéutico: Antiepilépticos.

Indicaciones: Tratamiento único o asociado de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias y de las convulsiones parciales simples o complejas con o sin generalización secundaria. Tratamiento de la neuralgia del trigémino y de la neuralgia del glosofaríngeo. Tratamiento de la manía aguda resistente al tratamiento con litio como monoterapia o terapia adyuvante.

Dosificación:

Anticonvulsivante

Adultos: 600 - 1000 mg/día.

Niños: 10 - 20 mg/kg/día.

Tratamiento de la neuralgia del trigémino y de la neuralgia del glosofaríngeo

Adultos: 100 - 200 mg/día, 2 - 3 veces al día hasta llegar a 600-1200 mg/día.

Tratamiento de la manía aguda resistente al tratamiento con litio como monoterapia o terapia adyuvante

Adultos: 100 - 200 mg dos veces al día.

Presentaciones:

Estuche con Blíster de 20 Tabletas de 200 mg



Línea Nutracéutica



Nutricap Keratine

Ingredientes Activo: Cisteína, Metionina, Vitaminas: B1, B3, B6, B5, C, Biotina, Aceite de Nuez, Lithothamne.

Grupo Terapéutico: Suplemento Alimenticio u Otros productos dermatológicos.

Indicaciones para su uso: Revitalizador del Cabello y uñas especialmente formulado para un tratamiento integral que revierte los problemas de debilidad del cabello y fragilidad de las uñas.

Dosificación:

1 cápsula al día durante el desayuno.

Presentaciones:

Estuche con Blíster de 30 Cápsulas



Línea Paramédico



Polifix®

Fórmula: Goma Karaya, Borato de Sodio

Grupo Terapéutico: Paramédico Dental.

Indicaciones: Adhesivo para prótesis dentales.

Modo de empleo:

Limpie la prótesis dental, después polvoree con polifix la superficie que va a ponerse en contacto con las encías y el paladar.
Oprímase ligeramente la dentadura postiza al colocarla en su lugar.

Presentaciones:

Frasco de 22 y 56 g de Goma Caraya y Borato de Sodio.



Línea Respiratoria



Monaliz 0.05% (50mcg)

Principio Activo: Mometasona

Grupo Terapéutico: Coricosteroides Nasales sin Antiinfecciosos

Indicaciones: Tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica y sinusitis aguda. Tratamiento sintomático de la poliposis nasal. Rinosinusitis Aguda. Tratamiento de los síntomas de la hipertrofia adenoidea, asociado a la rinitis alérgica, en la población pediátrica de 2 a 12 años de edad.

Dosificación:

Tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica y sinusitis aguda:

Niños a partir de 2 años: 100 a 200 mcg /día.

Niños mayores de 12 años y Adultos: 200 mcg/día.

Tratamiento sintomático de la poliposis nasal:

Adultos: 200 mcg/día.

Rinosinusitis Aguda: Niños mayores de 12 años y

Adultos: 200 mcg/día.

Dosis máxima: 400 mcg/día.

Presentaciones:

Estuche con Spray Nasal de 18 g/ 140 dosis. De Furoato de Mometasona 0,05% (50mcg)



Línea Respiratoria

Salres

Principio Activo: Salbutamol.

Grupo Terapéutico: Agonista B2 de acción corta Inhalador


Indicaciones: Tratamiento del asma bronquial y del broncoespasmo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Dosificación:

Niños a partir de 4 años: Según criterio médico cuando se requiera de 1 Inhalación (100 mcg) cada 6 Horas. Adultos y niños mayores de 12 años: 2 a 4 inhalaciones (200 a 400 mcg) la dosis puede repetirse cada 6 horas según sea el caso.

Presentaciones:

Estuche con envase para inhalación de 200 dosis de 100 microgramos.



Ventoduo

Principio Activo: Salbutamol + Beclometasona Dipropionato.

Grupo Terapéutico: Combinaciones Agonistas B2 +Corticosteroides Inhalados

Indicaciones: Anticolinérgico de acción corta inhalado.

Dosificación:

Dosis Adultos y adolescentes (a partir de 12 años): 2 inhalaciones (200 microgramos de salbutamol y 100 microgramos de beclometasona dipropionato), cada 12 a 24 horas. Niños de 5 a 11 años: 1 inhalación (100 microgramos de salbutamol y 50 microgramos de beclometasona dipropionato), cada 12 a 24 horas.

Presentaciones:

Estuche con envase para inhalación de 200 dosis de 100 microgramos/ 50 microgramos .

Línea Respiratoria

Atroaldo

Principio Activo: Bromuro de Ipratropio.

Grupo Terapéutico: Anticolinérgico.

Indicaciones: Anticolinérgico de acción corta inhalado.

Dosificación:

Adultos y niños mayores de 6 años: 2 Inhalaciones (40 mcg) de Bromuro de Ipratropio 4 veces al día. Dosis máxima: 20 inhalaciones (240 mcg) de Bromuro de Ipratropio al día.

Presentaciones:

Estuche con envase para inhalación de 20 microgramos/pulsación x 200 dosis.



Becloasma

Principio Activo: Beclometasona Dipropionato.

Grupo Terapéutico: Corticosteroide Inhalados.

Indicaciones: Tratamiento del asma bronquial, siempre que estén indicados los corticosteroides. Elimina o Reduce los efectos sistémicos de corticosteroides al que el paciente este sometido.

Dosificación:

La terapia en pacientes adultos y niños mayores de 12 años

Debería iniciarse a las siguientes dosis. Asma: 2 a 16 Inhalaciones (100 a 800 mcg) en dosis divididas según sea la severidad del caso. Leve 2- 4 Inhalaciones (100 a 200 mcg) /día. Moderada 4-8 Inhalaciones (200- 400 mcg) / día. Grave 8-16 Inhalaciones (400-800 mcg) /día.

Niños de 6 a 11 años:

Los niños deben recibir una dosis inicial de Beclo-Asma 1 - 2 inhalaciones (50-100 mcg)/día según la gravedad de su enfermedad.

Presentaciones:

Estuche con envase por inhalación de 200 dosis de 50 microgramos



Línea Expectorante



Benflux[®]

Principio Activo: Clorhidrato de Ambroxol.

Grupo Terapéutico: Expectorantes.

Indicaciones: Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales.



Dosificación:

Niños > 12 años y adultos: 90 - 120 mg/día, divididos en 2-3 dosis.

Dosis máxima en niños mayores de 12 años 120 mg/día.

Presentaciones:

Estuche con Blíster de 20 Tabletas de 30 mg

**PRODUCTO
OTC**



Dosificación:

- Niños de 2-4 años: 22,5 - 45 mg/día, divididos en 2-3 dosis. Dosis máxima 45 mg/ día.
- Niños de 4-6 años: 45 - 60 mg/día, divididos en 2-3 dosis. Dosis máxima 60 mg/día.
- Niños de 6-12 años: 60 - 90 mg/día, divididos en 2-3 dosis. Dosis máxima 90 mg/día.

Presentaciones:

Frasco de 120 mL de 15 mg de Clorhidrato de Ambroxol / 5 mL

Línea Expectorante



Bromexina

Grupo Terapéutico: Expectorantes

Principio Activo: Clorhidrato de bromexina

Presentación: 8mg /5mL x 120 mL

Indicaciones: Tratamiento de afecciones respiratorias que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales.

Posología:

Adultos: 1 cucharadita (5 mL) tres veces al día.

Niños mayores de 7 años: ½ cucharadita (2,5 mL) tres veces al día.



Lisomucin®

Grupo Terapéutico: Expectorantes

Principio Activo: Clorhidrato de bromexina

Presentación: 4 mg/5 mL (pediátrico) y 8 mg/5mL x 120 mL

Indicaciones: Tratamiento de afecciones respiratorias que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales.

Posología:

Adultos y Niños Mayores de 12 años: 8 mg o 1 cucharadita (5 mL) 3 veces al día (c/ 8 horas)

Niños de 6-12 años: 4 mg o 1 cucharadita (5 mL) 3 v/día (c/8 horas)

Niños 2-6 años: 2 mg o 1/2 cucharadita (2,5 mL) 3 v/día (c/8 horas)

Presentación:

Frasco de 120 mL de Clorhidrato de Ambroxol 8 mg/ 5 mL Adultos

Frasco de 120 mL de Clorhidrato de Ambroxol 4 mg/ 5 mL Pediátrico



Línea de Vitaminas inyectables



Complejo B Compositum

Grupo Terapéutico: Vitaminas del complejo B

Principio Activo: Vitamina B1, B6, B12 y lidocaína clorhidrato.

Presentación: 1 y 3 ampollas

Indicaciones: Indicado en neuritis, polineuritis por deficiencia vitamínica, trastornos metabólicos (diabetes mellitus, embarazo, alcoholismo) y anemia (megaloblástica).

Dosificación:

La dosis recomendada es de una ampolla, una o dos veces por semana hasta que mejoren los síntomas.

Presentación: Estuche con cama de 1 ó 3 ampollas



Vitamina B12

Grupo Terapéutico: Vitamina B12

Principio Activo: Vitamina B12 (Hidroxocobalamina).

Presentación: 1 ampolla

Indicaciones: Indicada en anemia perniciosa, síndrome de malabsorción, esprúe, enteritis regional, neoplasias malignas intestinales o de páncreas

Dosificación:

Dosis máxima: 10 mg día.

Presentación: Estuche con frasco de ampolla de 2 ml de Hidroxocobalamina 5 mg/ ml



Línea Oftalmológica



Xolatim

Principio Activo: Dorzolamida + Maleato de Timolol

Grupo Terapéutico: Preparados contra el glaucoma y mióticos. Agentes betabloqueantes. Timolol, combinaciones

Indicaciones: Tratamiento de la presión intraocular en pacientes con hipertensión ocular o glaucoma de ángulo abierto.

Dosificación:

1 gota en el(los) ojo(s) afectado(s) cada 12 horas.

Presentación: Frasco gotero de 5ml de Dorzolamida 20 mg y Maleato de Timolol 5 mg